

## PROFİLAKTİK PEYVƏNDLƏRİN TƏQVİMİ

Yaşı	Peyvəndlər	
Doğumdan sonra 12 saat ərzində	<b>HepB</b>	hepatit B xəstəliyinə qarşı peyvənd
	<b>BCG</b>	vərəm əleyhinə peyvənd
2 aylıqda	<b>AGDTHePBHib</b>	difteriya, göyöskürək, tetanus, hepatit B və B tipli hemofil infeksiyaya qarşı peyvənd
	<b>OPV</b>	poliomielitə qarşı peyvənd
	<b>Pk</b>	pnevmonokok infeksiyaların qarşı peyvənd
3 aylıqda	<b>AGDTHePBHib</b>	difteriya, göyöskürək, tetanus, hepatit B və B tipli hemofil infeksiyaya qarşı peyvənd
	<b>OPV</b>	poliomielitə qarşı peyvənd
	<b>İPV</b>	poliomielitə qarşı inaktivləşdirilmiş peyvənd
4 aylıqda	<b>AGDTHePBHib</b>	difteriya, göyöskürək, tetanus, hepatit B və B tipli hemofil infeksiyaya qarşı peyvənd
	<b>OPV</b>	poliomielitə qarşı peyvənd
	<b>Pk</b>	pnevmonokok infeksiyaların qarşı peyvənd
6 aylıqda	<b>İPV</b>	poliomielitə qarşı inaktivləşdirilmiş peyvənd
	<b>Pk</b>	pnevmonokok infeksiyaların qarşı peyvənd
12 aylıqda	<b>QPM</b>	qızılça, parotit və məxmərəyə qarşı peyvənd
	<b>Vit A</b>	vitamin A
18 aylıqda	<b>GDT</b>	difteriya, göyöskürək və tetanus qarşı peyvənd
	<b>OPV</b>	poliomielitə qarşı peyvənd
	<b>Vit A</b>	vitamin A
6 yaşında	<b>QPM</b>	qızılça, parotit və məxmərəyə qarşı peyvənd
	<b>DT</b>	difteriya və tetanus qarşı peyvənd
	<b>Vit A</b>	vitamin A